

Поражение аппендикса при заболеваниях женских половых органов очень хорошо известно гинекологам.

На значительном материале **Н. В. Плотникова** установила, что у 62,14% женщин, страдающих заболеваниями половой сферы, червеобразный отросток изменен в той или иной степени. Изменения отростка могут наблюдаться также при смещениях матки, опухолях. Смещение этих органов, несомненно, может чести в ряде случаев к нарушению крово- и лимфообращения, а возможно, перистальтики и опорожнения

[червеобразного отростка](#)

и развитию аппендицита. Нередко аппендикс бывает изменен и при внематочной беременности и при кистах яичников, особенно в случаях разрыва кисты. Чаще же всего воспалительные изменения в наружных слоях отростка бывают при

сальпингооофоритах

. Кроме наличия непосредственной лимфатической связи между отростком и придатками матки, это объясняется еще и тесным пространственным расположением этих органов. Что касается наблюдающихся атрофических и склеротических изменений в стенке червеобразного отростка при заболеваниях женской половой сферы, то, возможно, в ряде случаев они также являются результатом постоянного воздействия патологического процесса в половых органах, но возможно и простое сочетание этих изменений.

Материалы по теме:

1) [Гнойный мастит](#)

- 2) [Атрезия пищевода у новорожденных](#)

- 3) [Ошибки послеоперационного периода](#)